

識
病
捷
法

識病捷法卷之七

蘇邵長洲慕松繆存濟纂集

久病門

有八名

此門古來無載余獨立之蓋為宇宙之民諳此條
目可以知戒遷善無求自沒醫者虛心不可妄投
藥耳

譴責病

橫惡陰謀尅薄寺人天神譴責痾疾綿綿雖仙

丹不治欲求自愈即當遷善

誤醫病

假如人患肝經之症醫者認病欠明以別經治之別經無病受藥以致戕賊變症牽延反被藥傷人矣延醫之家不可不擇

藥傷病

凡病服藥睡去或因胃虛藥不輸化遂成藥傷病醫所不識遲投本病之劑終不取効將生黃豆與患人食不惡心是也先服甘草飲不愈再服藍根散醫者須先囑病人服藥後不可睡去

富病

富者患病惟求速愈殊不知病有淺深服幾劑不効又去更醫名曰藥劑亂投變病不一何異於求榮而反辱也

貧病

貧者患病雖欲求醫為口體不充只得因循歲久而頑醫無施治之心豈為仁術也

諱疾病

痴愚等人患病在已竟自隱瞞名曰諱疾忌醫經久元氣耗散終不得治

鬱病

寡婦尼姑室女僧道情慾熾甚不遂遂生鬱矣
鬱則正氣留而不行其氣疑結終日懨懨病加
煩劇豈藥可治欲求自活須返邪歸正

榮枯病

前富貴後貧困鬱而成疾余每見醫者與藥治
之百無一痊須是勸令其聽命榮枯自然獲安
矣

甘草飲

甘草

主一兩

白礬

半兩

延胡索

一兩

右為末每服三

錢水一盞煎至六分待藥冷細細呷之
藍根散

藍根根一 蘆根根一 萊豆合一 右先將二根已水
一碗煎至七分去滓次微炒豆為末和勻分三
服先服一二服利下惡物不用第三服如不利
下再服之

鬱病門

有十五名

經云五鬱發之乃治之之法以平五臟也五臟有五行配合金木水火土之氣一有鬱積則當發之是後其本然之性而治之更有六淫邪氣入而不出七情之氣結而不散痰與血食結而不消皆謂之鬱也且有久病多鬱者凡病久之人情緒不舒致使脾氣不和新病方增舊病亦甚治療之時無分新舊無別邪正日遠病深愈為難治是誰之愆醫者寧人之責而不用心於審察乎

○總脉

沉濡為氣

沉遲為寒

沉細為濕

沉微為血

沉數為熱

沉滑為痰

氣口緊盛為食

○治法

凡用諸藥中春加防風夏加苦參秋冬加吳茱萸

凡藥皆在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之
假如食在氣上氣升則食自下餘倣此

凡用蒼朮米泔拌炒撫芎總解諸鬱貝母解痰

鬱香附童便浸炒解氣鬱
凡冬病惡寒亦用解鬱則愈

五鬱

心火鬱發之當看何經謂汗之也
肝木鬱達之謂吐之令其條達也
脾土鬱奪之謂下之令無壅滯也
肺金鬱泄之謂滲泄解表利小便
腎水鬱折之謂抑之制其衝逆也

六鬱

氣鬱

胸脇痛脉沉滿。用香附蒼朮撫芎

濕鬱

周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉細。用
蒼朮白芷川芎茯苓

熱鬱

目瞽小便赤脉沉數。用山梔青黛香附蒼朮
撫芎

痰鬱

動則喘寸口脉沉滑。用海石香附南星瓜蒌
血鬱

四肢無力能食便紅脉沉○用桃仁紅花青黛
川芎香附

食鬱

噎氣惡食飽滿不能食左寸脉平右寸脉緊盛
○用香附蒼朮神麴麥芽山查草菓之類

久病多鬱

久病之人情緒不舒分外有鬱醫者須先勸令
病人放開懷抱舊病可治必以內經治法論告
之以其易行之以其難雖是不死之症語之以
其死病者畏死始肯聽言而不生鬱切不可投

鬱藥而反傷其真也

久病陰虛氣鬱發熱

用芍藥炒一兩二錢香附童便浸一兩炒蒼朮
米泔拌炒三錢片苓三錢炒甘草生錢半石為
末水丸食遠服

婦人憂鬱傷脾不思食

用酒炒芍藥黃連童便拌炒各等分為末姜汁
糊丸服

手足心發熱屬火鬱

火輕宜降火盛宜發汗

耳門

有二十一名
外附十五條

耳為腎之竅交會於肝胆小腸三焦之經其他臟腑之脉皆絡於耳若水虛則熱甚上客經絡衝於耳中隨脉氣微甚邪氣淺深而作耳鳴耳聾諸症也至老人多病頭目昏眩耳鳴耳聾皆陽實陰虛所致俗言老弱為虛寒用之以熱劑此乃舉世受悞經言陽氣上甚而躍故耳鳴也又云心本熱也虛則寒矣腎本寒也虛則熱矣據理推之非熱而何耳鳴者其聲不一耳聾者所感不一腫痛膿汁

各各不同所以治之則異凡患此科善調養者則精氣神足不藥漸愈弗能謹守者雖藥對症難以取効也

○虛脉道二

左尺脉大無力 右尺脉微細無力

○風脉道二

左關脉絃緊

○熱脉道四

左寸脉浮小 右尺脉浮小

○勞脉道二

右關脉 洪 大

○不治症名三

虛聾

久聾

乾町鳴

○治法

凡耳聾大病後與陰虛火動耳聾者宜降火以
四物湯為主

凡耳聾用流氣飲加菖蒲生薑治聾皆當調氣
凡耳聾用葶麻子四十九粒棗肉十枚入人乳
搗膏石上曬乾丸如梧桐子大綿裹塞耳中
凡耳鳴用草烏石菖蒲等分為末綿裹塞耳中

一日三次即止

凡耳鳴證或鳴其如蟬或左或右或時聞塞世人多作腎虛治不知是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣清痰降火治之

凡耳鳴若腎虛而鳴者甚鳴不甚人必多怒當見勞怯等症

凡耳痛以吳茱萸烏頭尖大黃為末塗湧泉穴以布裹之

凡癰耳膿出用桑白皮一片炙麝香二分為細末乾摻之

凡耳熱出汁用石膏防風天花粉為末搽之
凡虫入耳用香油灌入耳中或用鷄冠刺血灌
入耳猶妙

耳久聾

勞傷精氣神三者又為風邪停滯鳴久後聾名
曰久聾○不治

耳虛聾

腎經原稟虛憊不由三因之邪所干以漸而聾
名曰虛聾○不治

耳勞聾

勞役傷其氣血滯憊耗其精元始其証瘦瘁力
疲昏昏憤憤名曰勞聾。服補中益氣湯

耳風聾

宗脉所附脉虛則風邪乘之風入於耳使經氣
否塞不聞聲音名曰風聾。治宜疎風益氣

耳厥聾

諸經適有交併則臟氣逆而為厥厥者寒也厥
氣搏入於耳致聾者名厥聾。治宜順氣溫經

耳氣聾

有因氣塞致聾名曰氣聾。治宜順氣

耳虛鳴

耳中作風水聲或鍾聲眼或見諸光名虛鳴○
服滋陰固本丸○用透耳筒法或用通耳丸
耳勞鳴

勞碌傷脾勞則火起於筋血脉受傷風熱相乘
氣與之搏故為耳鳴名曰勞鳴○先服芎藭飲
加枳殼紫蘇生姜一貼疎風下氣續以滋陰補
中丸服之

耳風鳴

耳觸風邪與氣相搏其聲嘈嘈名曰風鳴○服

正考散

耳腦鳴

風邪入於腦久而不散經絡壅塞耳中惺惺然
鳴或作旋運名曰腦鳴。服磁石浸酒藥

耳內障鳴

因飲食不節勞役形瘦中氣不足得受內障先
鳴不已則後聾名曰內障鳴。服益氣聰明湯

病後耳鳴

大病後或傷寒或產後或失血過多致五鳴不
已則聾名曰病後鳴。服滋陰固本丸

耳瘡鳴

因發瘡毒後腎氣則熱其症心中不寧亦致耳鳴或疼名曰瘡鳴。服地黃湯

耳蟬鳴

因腎氣不足熱毒之氣乘虛攻耳其聲如蟬名曰蟬鳴。服龍蔴散

上焦耳鳴

上焦之氣為風熱所干其病四肢滿急昏悶不利先鳴不已致聲。服茯神散

痰熱耳鳴

腎中痰滯風熱相兼其病頭重目眩先鳴不已
致聾○服犀角散

乾聾耳聾

耳中生乾聾致鳴致聾○服柴胡聰耳湯○用
附子丸法

耳夜鳴

夜間睡着如打鼓之聲耳內風吹名曰夜鳴○
服黃芪丸

耳沸鬧

耳中如湯沸聲或噪鬧聲○用鴉膏法

睥耳

因洗面沐浴湯水入耳膿汁並出不止名曰睥耳。用白朮散

治耳出血水

。用麝香佛手散吹耳內。服犀角地黃湯加枳殼

耳卒痛

卒得風疾耳聾恍恍卒痛者。用白鹽方

治痺耳

耳內外主痺瘡。用馬駝方

治大病後耳聾方

右用生菖蒲裂汁滴耳中即効

治蜒蚰入耳方

雄黃綠礬石半夏各一两右為末以醋調一字灌入耳中即出

治百虫入耳

桃葉心

枚二十

胡麻

令一升炒

右先以桃葉心塞耳

中其虫必死未出將胡麻以葛袋盛枕耳邊虫自出又方鷄冠血滴入耳中即出

治蚤虱入耳

治兩耳虛鳴

白茯苓

兩

乾山藥

兩

杏仁

炒去皮尖

右為末黃蠟

二兩

熔化和丸

如彈子大

每服一丸

食後細嚼

鹽湯送下

治一切耳聾

石菖蒲

一寸

巴豆

一粒

全蠍

去毒右為末葱汁丸

如棗核大

綿裹塞耳內

治耳出血

射香

少人牙

煨存性

為末

每用少許

吹入耳內

即乾口

又治小兒痘瘡

出復靨

酒調一字

即出

治凍耳成瘡

栢葉

三兩微炙為末

杏仁

四十九个泡去皮尖

亂髮

如雞子大

食鹽

許少

黃蠟

半兩

乳香

錢五

清油

一斤先煎油入亂髮消

盡為度次下諸藥末煎黃色去滓後下乳香黃

蠟攪令如稠糊礮罌盛鵝羽塗之

治耳內疼

草烏削如棗核大塞耳孔疼立止

治耳汁耳膿耳痛

杏仁炒令赤黑研成膏綿裹塞耳孔中一日換

三四次

治卒耳聾耳內作風水鍾聲

穿山甲蛤粉炒蠟稍七麝香許少為末以蠟入麻

油一滴為丸綿裹塞耳內

治多年耳聾十日見効除根

川烏頭一个炮去皮脐尖細辛各一錢膽礬五分活鼠

一箇熱湯浸死破開取胆真紅色是右為末用鼠膽調和勻再焙

令乾研細末却入射香半字用鵝翎吹入耳中

吹時含茶清待少時

治耳卒腫出膿并底耳及治耳聾不瘥有虫

用礬石熬令汁枯研細每以簪筒吹少許入

耳中日三四度或以綿裹如棗核大塞耳中亦得一方先以乾鹽摻之次入礬末猶妙一方先以紙纏去耳中汁次以礬末粉耳中次以食鹽粉其上食久乃起不過再度未瘥一方不用鹽益氣聰明湯

黃蘗

酒製

芍藥

各半錢

蔓荊子

錢一升

麻

錢五人參

黃芪

甘草

各二錢半

葛根

錢半

右作一服水二鍾

煎至一鍾臨卧服

透耳筒

椒目

巴豆

菖蒲

松脂

各一錢

右為

末攤令薄捲作筒子塞耳內一日一易一方同
川椒以蠟為丸如棗核大塞耳中一方無松脂
白就散

白礬

枯

黃丹

龍骨

各五錢

麝香

錢一

右研極

細末以綿杖子展盡耳中水用藥一字分摻兩
耳一日摻二次勿令風入

磁石浸酒方

木通

遠志

去心

防風

著蕢

菖蒲

芎藭

蔓荊子

白茯苓

甘菊花

細辛

乾姜

炮

肉桂

各兩

地黃

三兩

右為末和勻以生

絹袋盛以酒二斗浸藥七日後每日任量飲之
以瘥為度

白鹽方

右用鹽五升甑上蒸熟以耳枕之冷即換亦治
耳疼一方用軟布裹熨患耳或青布裹之亦可
芎藭飲

川芎

當歸

細辛

各半兩

官桂

去粗皮

菖蒲

白芷

各三錢

右每服三錢水二盞入紫蘇姜棗煎

至一盞去滓不拘時服

犀角散

犀角屑

石菖蒲

交門冬

心去

前胡

菊花

枳殼

生地黄

澤瀉

木通

羌活

甘草

各等分

右每服一兩水二鍾煎至一鍾服

茯神散

茯神

去木一兩

蔓荊子

石菖蒲

薏苡仁

羌活

防風

五味子

黃芪

各五錢

甘草

二錢

交門

冬

去心一兩

右作五服每服水二鍾煎至一鍾服

龍齒散

白茯苓

龍齒

交門冬

心去

遠志

心去

人參

各五錢

丹砂

研

鐵粉

研

龍腦

研

麝香

牛黃

研各一分

右為末研勻每服半錢食後用白沸

湯調服日進三服

柴胡聰耳湯

柴胡

錢三

連翹

錢四

水蛭

半錢炒研

蜚蠊

二錢各一另研

麝香

少許

當歸身

炙甘草

人參

各一錢

右除

蜚蠊外以水二盞入生薑三片煎至一盞去滓

稍熱下水蛭蜚蠊末再煎一二沸食遠稍熱服

黃芪丸

黃芪

兩一

大黑附

個一

羌活

錢五

白蒺藜

尾焙去刺五錢

羯羊腎

一個乾

右為末酒糊丸如梧桐子大每服

三四十丸空心煨葱鹽湯送下一方有破故紙

無白痰藥

補中益氣湯

見脾胃門

犀角地黃湯

見血門諸

滋陰補中丸

見虛損門

滋陰固本丸

見虛損門

四物湯

見血門諸

附子丸法

見開卷末

地黃湯

見開卷末

蔓荊子散

見開卷末

鵝膏法

見開卷末

草烏削法

見開前耳內

亂髮方

見開卷末

馬駝方

見開卷末

舌口門

有三十四名

口乃脾之竅五味之所入也舌乃心之苗舌和則知五味五味之氣歸於五臟五味過爽則五臟之氣偏勝諸疾生焉且鹹味能助火為寒淡味能收飲能為停滯辛味能發散能為燥甘味能中滿能為緩苦味能泄能為熱惟淡味則為五行之本也其病口臭者脾熱也口瘡者脾氣凝滯風熱加之治法各隨後開病之形狀方藥取用之

○不治症

風寒所中舌捲

舌捲蕪囊縮肝絕

小兒口瘡不下食以狐惑治死 脾熱舌強

○辯驗舌口法

心脉絲舌本 脾脉絡舌旁 肝脉絡舌本

肝氣壅舌上血溢 心氣熱舌裂口瘡

肝氣閉舌胎如雪 腎氣熱舌上黑胎

脾氣熱口臭舌硬 七情氣鬱舌上腫

○治法

凡舌口病服涼藥不愈此酒色過度

凡勞碌不睡舌上光滑無皮

凡舌口因憂思損傷中氣虛火泛上無制用理
中湯甚者加附子或官桂嚙之

凡實熱口生瘡用涼膈散又方用細辛黃柏炒
為末搽口內取涎

凡滿口生瘡或腫毒重舌用薄荷荊芥甘草各
五錢青黛百藥煎玄明粉硼砂各三錢五分
點患處

凡口噤牙關難開用霜梅白礬姜蠶為末擦牙
根上○又方雄黃食鹽川椒各一錢皂莢子
一枚燒灰擦牙根上

赤口瘡

用枯白礬乳香沒藥銅綠共研末搽之不愈再
用口瘡方

白口瘡

用雄黃乳香沒藥各一錢輕粉五分巴豆一粒
去油共為末搽之不愈再用口瘡方

小兒口瘡

不下食以狐惑治之必死○用礬湯浸腳半日
又用黃柏為末蜜丸服之再用姜黃炒為末搽
瘡口上立効

口糜爛

用野薔薇煎湯漱口

口乾燥瘡

服杏仁散外用口瘡方

口臭

用含香丸

口內疳瘡

服走馬散不愈再用口瘡方

口舌生瘡爛痛

用蟾酥方不愈再用口瘡方

口舌生瘡時時出血咽腫痛

服加味龍石散

口舌乾煩渴

服牛黃丸

口舌乾神不清頭目不利

用含化丸

肺熱口臭發渴小便多

服地骨皮丸

心氣不足口草

服益智甘草為末沸湯調服

用熟唇焦枯無潤澤

服地黃煎

胆痺熱口苦

服龍胆湯

膀胱熱不已口舌生瘡咽喉腫

服升麻煎

多食肉口臭不欲聞穢惡

服升麻黃連丸

冬月唇乾拆血出

用桃仁搗爛以猪脂調塗

飛絲入口舌間生泡此最可畏

用紫蘇葉方

唇上生惡核腫起

服獨活散不愈再用松脂方

唇上腫破

服五福化毒丹

唇吻惡瘡

服黃連散

緊唇燥裂

服橄欖散

舌腫硬

服百子霜

舌腫出血

用海礞硝方

舌生白瘡語聲不真

服薄荷蜜煎

舌腫懸尺許傷寒舌出數寸

用縮舌膏

舌出血不止名舌衄

服槐花散

舌腫起猪胞忽然碎破遂巡殺人

眼百子霜

木舌滿口不急治殺人

服飛礬散

木舌舌腫

服玄參升麻湯

木舌

用半夏醋灌方

重舌

用角刺朴硝

原方

小兒初發之

傷寒後不能轉攝舌出不收

用巴豆方

杏仁散

杏仁湯泡去皮尖麥門冬去心赤茯苓黃連

地骨皮山梔子仁黃芩各等分右為末每服一

錢五分白滾湯調服

瓜蒌根散

瓜蒌根胡黃連黃芩各三兩白殭蚕炒大黃

白蘚皮牛膝研滑石各二兩右為細末研勻

每服二錢用竹葉煎湯調服

噙化丸

石膏

水細研飛

寒水石

細研

白蜜

各半

右用水四大盞

煎取一大盞半綿濾過入蜜同煎令稠丸如雞

頭實大常含一丸津嚥

含香丸

鷄舌香

芫蕒

各一兩

藿香

甘松

當歸

香白芷

桂心

桂花

各半兩

零陵香

三分

丁香

麝香

研分

木香

三分

肉豆蔻

白換柳

各五分

右

為末煉蜜丸如芡實大常含化一丸嚥津

地骨皮丸

地骨皮 桑白皮 山梔子 馬兜 黃芪

各等 右為細末甘草膏和丸如芡實大每服一

丸食後噙化

升麻黃連丸

升麻 青皮錢各五 黃芩洗酒 黃連各二 生薑

生甘草 檀香錢各二 右為末水浸蒸餅為丸如

彈子大每服一二丸不拘時細嚼白湯送下

地黃煎

生地搗汁 麥門冬生 萎蕤各二 生天門冬搗汁

黃芪 升麻各半 生甘草 細辛 川芎

白朮各一兩右剉綿裹酒浸一宿以猪脂二片煎

至藥令焦綿漚去滓納鍋中後下地黃門冬汁

熬令調磁罍盛每服半匙不拘時嚙嚥下

走馬散

山梔子不拘多少右為細末吹入口中

龍膽湯

龍膽草 黃連各四錢 人參 天門冬 知母

黃芩各七錢 柴胡一錢 山梔子 麥門冬 五味

甘草各五分 右為細末每服五錢水一鍾半煎至

七分不拘時服

蘆薈湯

蘆薈

青蒿

研

蟾酥

羊蹄花

白礬

麝香

研

牛黃

各等分

蝸牛

瓜蒂

故二十

丁香

細辛

去苗

丹砂

研各一分

馬牙硝

三分

熊膽

所一錢

右為

細末研勻先以頭髮裹脂於溫水內蘸脂之軟

帛挹却膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去

蟾酥蘆薈看病大小以意加減用之

升麻煎

升麻

玄參

射干

各四兩

薔薇根白皮

四兩

大青

黃屎

各三兩

右水七升

煮取一升五合

去滓下蜜更煎一二沸

蟾酥方

蟾酥用溫以線惹日曝乾剪半寸含之有涎即吐
出如牙疼即咬之立瘥

定齋洗足法

右以白礬為末湯化洗足愈為度

加味龍石散

龍腦半錢

寒水石四兩

硃砂二錢

馬牙硝一錢

鉛白霜

蓬砂各半

甘草五分

右研細末

用少許

搽患處吐津候乾不妨

紫蘇葉方

用紫蘇葉細嚼白湯嚥下即愈

黃連散

黃連

朴硝

白礬

各半兩

薄荷

一兩

右為末

用臘月黃牛膽將藥入內風頭掛兩月取下如
有口瘡將藥研細少許摻瘡上去其熱涎即愈

口瘡方

生半夏為細末醋調貼腳心中神効

海螵蛸方

海螵蛸

蒲黃

各等分

右為末以井花水調敷

玄參升麻湯

玄參

升麻

赤芍藥

牛角

桔梗

管仲

黃芩

甘草

各一分

右每服四錢水

一鍾半煎七分去滓不拘時服

黃連散

黃連

一分

乾姜

炮半

右為細末每用少許敷瘡

口上不過三次愈一方有膩粉

椒欖散

右用椒欖不拘多少燒灰為細末以猪脂和之

患處一方用核中仁細研敷之

五福化毒丹

玄參

洗焙

桔梗

各二兩

人參

五錢

茯苓

一兩

麝香

一分

馬牙硝

洗焙

青黛

各一兩

甘草

七錢

右為末

研勻

煉

蜜為丸

如皂角子大

每服一二丸

薄苛湯

化下

如口臭

生地黄汁

化

下食

後服

重舌方

皂角刺

版朴硝

許火

右研勻

先以手蘸水

擦口內

并舌上下

將藥摻舌

上下涎出自消

獨活散

獨活

桑寄生

犀角屑

漢防已

升麻

沉香

大黃

炒

連翹

各三錢

甘草

五錢

右剉

每服三錢水一鍾煎六分去滓不拘時溫服

半夏醋灌之

用半夏醋煎灌至軟吐出涎即瘡如不愈再用

飛礬散

飛礬散

白礬

燒

百草霜

各等分

右為細末捻糟茄自然

汁調若口噤桃開灌之妙

薄苛蜜煎

薄苛

取白蜜

各苛

右以生姜片先蘸水揩洗

後用二味

煎服之一方用生姜揩洗後竟用硃

砂蓬砂雄黃腦麝為末敷之良久未効更加玄

明粉

百草霜散

右用釜下墨末以醋調厚傳舌上下脫去更傳

須臾即消若先決去血汁更傳之尤佳凡此患

人皆不識或醋治益因殺人甚急但看其舌下

自有噤重形狀如蜈蚣或如卧蠶子細看之有

頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自消
縮舌膏

右用片腦成片頓於舌上三四次合就無事

巴豆方

右用巴豆一枚去油取霜用紙撚捲之納入鼻
中舌自收

槐花散

槐花多似右曬乾研末傳舌上或人炒出火毒
為末傳如舌腫用蒲黃末乾摻之

松脂方

松脂

兩半

赤小豆

大黃

白欬

錢各一

右為

細末鷄子白調塗唇上

柴胡湯

見傷寒門

理中湯

見傷寒門

瀉黃散

見火門

涼膈散

見火門

甘桔湯

見火門

鼻門

有十五名
外附三條

鼻乃肺之竅清氣出入之道路若氣和平陰陽升降則呼吸通利鼻知香臭矣心肺有病而為不利也或六淫七情內外所干則鼻氣不得宣通清道壅塞而為病也凡此症全要驗其內外結邪之微甚宜以辛溫辛涼之藥可也

鼻塞聲重

傷則為二病○服細辛散

鼻淵

胆熱移於腦辛頤則為濁涕不止。用腦漏方
鼻痔腫

氣壅熱留日久則為鼻痔腐潰汁臭。服椿根
湯又用藍綻

鼻嚏

心火邪熱或風干肺胃鼻中痒而發噴之聲不
因風熱而作嚏者乃胃中志和而氣達

酒瘡鼻

因酒熱毒積久於上為酒瘡鼻。用生硫黃方
鼻痛

服白芷散

鼻衄

服小薊湯

鼻流不通

服辛荑散

鼻清涕

服川椒散

鼻内生息肉

用鼻痔方

鼻瘡一

服辛夷膏

鼻中膜脹

服

鼻癰

服黃白散

鼻痔

用鼻痔方

鼻從鼻中縮入腦中介介痛不止

服脂膏方

治鼻塞不聞香臭

服麗澤通氣湯

治鼻口急痺蝕數日欲死

右用藍綻傳之令遍日十度夜四度立瘥

治卒食物欲從鼻中縮入腦中介介痛不出

用牛脂如指頭大入鼻中吸取脂入裡須臾飲
食隨脂出

防風散

防風

去芦
兩半

麥門冬

去心

甘草

炙

川芎

黃芩

人參

各一
兩

右為末每服二錢食後葱茶調服

小薊湯

小蘗一把水三升煮取一升去滓溫服曾有人
陰冷漸斬冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼痛不能
眠煮大蘗根汁服之立瘥一方為末酒調服

痰藜汁方

治鼻塞多年不聞
香臭清水出不止

右取當道經過痰藜汁一把搗以水三升煎取
熟先仰卧使人滿口含飯取一合計灌鼻中使
人不過再度大嚏必出一兩箇息肉以赤蛹虫
一方有黃連等分同煎

鼻痔方

明礬

一兩

單麻

七箇

鹽梅

五箇

麝香

少許

右搗為

九綿裹塞鼻內令著息肉候化清水出四邊自然玲瓏其息肉自下

地龍散

治鼻中息肉

地龍

去土炒一分

猪牙皂莢

一挺煨存性

右為末先洗鼻

內令淨以蜜塗之敷藥少許在內出清水盡其息肉自除

生硫黃方

生硫黃

半兩

杏仁

半兩

錢

輕粉

錢一

右為細末用酒餅

藥調卧時塗上早則洗去數次絕根

華澄茄丸

治鼻不通

華澄茄錢五薄荷葉錢三荊芥穗錢三右為細末煉
蜜和丸如櫻桃大不拘時噙化一二丸

通草膏

通草

附子地

細辛

各等分

右為細末煉蜜

和丸如棗核大綿裹塞鼻內

腦漏方

生附子為末煨葱汁調塗足心裹腳布裹之

白芷散

白芷為細末葱搗為丸如小豆大每服二十丸

茶清送下

辛夷膏

辛夷

川芎

細辛

洗去泥

木通

防風

藁本

羌活

升麻

白芷

甘草

各等分

右為末每服二錢茶調下

川椒散

灑澤通氣散

開末卷

開末卷

細辛散

辛夷散

開末卷

開末卷

黃白散

椿根湯

開末卷

開末卷

牙齒門

有十五名

齒乃骨之餘腎經總司腎衰則齒鬆精固則齒堅
其上牙分與胃骨凡有疾是胃家之實熱下齒本
經自屬凡有疾是腎之虛寒但其疾名狀雖多而
病情不出虛實六淫之邪故病有惡寒作痛者有
惡熱作痛者有惡寒惡熱作痛者有惡寒飲少熱
飲多作痛者有惡熱飲少寒飲多作痛者有牙齒
動搖作痛者有牙齒但為痛者有齒斷為疳蝕缺
少血出為痛者有斷腫為痛者有脾胃中風邪

惡風作痛有胃中氣少不能任寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛穢氣不可近者其痛既各不同其藥亦各有異耳

○不治症各

走馬牙疳

○治法

凡齒痛先用立効散

走馬牙疳一時腐爛即死

用婦人溺桶中白垢火煨一錢銅綠三分冰片一分再研敷之不愈再用走馬牙疳方

牙縫出血

用槐樹嫩葉杵爛敷牙關上

風蛀牙疼

服三因玉地散○又方用天仙子燒烟以竹筒抵牙引烟薰之其虫即死

風寒濕牙疼

服羌活湯

風毒牙疼

服獨活散

寒熱牙疼

服當歸龍胆散

大寒犯腦牙疼

服白芷散

熱多寒少牙疼

服麝香散

胃虛風熱牙疼

服梧桐淚散

因服熱藥牙疼

服甘草飲加黃連

虫蛀牙疼

服竹堂方

齒痛血出不止

服調胃湯

腎虛牙疼

服八味丸

打動牙齒

服蒺藜散

牙根腫

須用刺出血如血汚難刺烙鐵物烙其齒

取牙不犯手

用本事方

常日牢牙法

用香鹽散

取牙落不犯手方

草烏

華撥

各七錢半

川椒

細辛

各一兩半

右為

末每用少許揩在患處其牙自落

八味丸

即六味地黃丸加

調胃湯

即調胃承氣湯為末蜜丸服之

三因玉地散

地骨皮

白芷

升麻

防風

細辛

藁本

川芎

當歸

槐花

甘草

各半

右為末用少許揩痛處取二錢水半鍾加

黑豆半合姜三片煎湯漱

獨活散

獨活

羌活

川芎

防風

各五錢

細辛

荊芥

薄荷

生地黄

各二錢

右為末每服

三錢水半鍾煎漱口嚥之

華嚴散搗藥

華撥

合姜

胡椒

細辛

各半

右為

末每少許含溫水隨通處鼻內搐按此足少陰太陰藥

白芷散

草豆蔻

麻黃

各錢半

黃芪

升麻

各錢一

熟地

當歸

各五分

吳茱萸

白芷

各四分

藁本

三分

桂枝

二分半

羌活八分右為末溫水漱淨以藥擦之

胡桐淚散

胡桐淚

石膽礬

黃礬

蘆薈

各錢五

朱砂

細辛

當歸

川芎

牛膝

各錢半

麝香

亂髮

各錢一

升麻

錢五

右為末先以甘草湯漱口後

用藥少許敷之以常用少許擦牙去風熱消腫
化毒牢固永無牙宣疳血之病

當歸龍胆散

草豆蔻

草龍膽

升麻

黃連

各一錢

白芷

骨灰

當歸尾

生地

各五錢

麻黃

一錢

右為末

每用少許擦之

立効散

小椒露

蜂蜜

青鹽

各等分

右為細末煎數

沸熱嗽口即止

養活湯

麻黃

去節 三兩 一錢

草豆蔻

錢一 柴胡 錢五

升麻

蒼朮

各五 防風 三分

當歸身

六分 細辛 少許

白芷

官桂

各三 藁本 三分

羊脰骨

錢五 分二

右為末先

以溫水嗽過擦之

疾藥散

疾藥根

燒

研細末

敷痛處

香鹽散

人香附子

以令極 黑三兩

青鹽

半斤 右為細末如常

法擦用

麝香散

麻黃根分一草豆蔻黃連各錢益智二分當歸

生地黄漢防已製酒人參各三骨灰錢二升麻

熟地分各二麝許少右為末擦之

清胃散

升麻錢一牡丹皮分五生地黄製酒當歸各三黃連

分三右為末作一服水煎冷服

神功丸

黃連製酒砂仁各半生地黄甘草各三木香

霍香葉歸身錢各一升麻錢二蘭香葉如代之

錢一右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服百丸

至二百丸白滾湯送下

走馬牙疳方

鮮明銅綠不拘多少入乾鍋內炭火燒令赤傾
出好酒伴勻再入鍋內熬數次待色紅為細末
入麝少許研勻先水嗽口以藥些少敷牙患處
涎即吐出

甘草飲

是火
毒明

竹堂方

開牙
藥

瘧門

有六名

諸瘧項強筋勁強直而不柔和屬濕諸暴強直搖
掣其筋勁強有力不柔和屬風然燥金主於緊歛
短縮勁急且人之筋各隨經絡結束於身內因氣
血兩虛外為風濕及寒熱所中而成瘧也風能散
氣故有汗不惡寒名曰柔瘧又名陰瘧寒能泣血
故無汗而惡寒名曰剛瘧又曰陽瘧傷寒汗下過
多病瘡之人產婦及吐血失血溫病熱入腎中小
兒癰病熱盛或因七情怒氣或因濕熱內盛痰涎

經滯經絡悉可以成瘧隨症而治不可不察也

○絕脉

脉浮緩無汗寒

脉浮緊有汗風

脉來沉細是濕

○不治脉

脉來澶澶如蛇

是無胃氣

○不治症

產後瘧汗出如雨

○治法

凡外邪作瘧用風濕藥

凡內症作瘥補血實脾平肝清痰去濕
凡瘥氣血內氣四氣外襲不可作風治

凡瘥大率與癰相似比癰更甚為虛帶補

凡瘥氣虛有火煎痰用人參竹瀝之類可用風
藥黑瘦人去參用白朮

凡諸瘥項強皆屬濕亦有痰者

剛瘥

寒邪泣血故無汗惡寒。服神朮湯

柔瘥

風邪散氣故有汗不惡寒。服白朮湯

胸滿口噤脚攣急咬齒

服大承氣湯

產後成瘧

用輕舉敗毒散

汗後中風成瘧

用輕舉敗毒散

因發汗過多成瘧

用防風當歸湯

神術湯

羌活

獨活

麻黃

白朮

各等分

右用

水二鍾煎至八分熱服

白朮湯

白朮

黃芪

桂心

各等分

右用水煎服

輕舉敗毒散

荊芥穗不拘炙少微炒為末大豆卷栢熟酒浸去卷栢取汁調荊芥末四錢飲之其効如神

防風當歸散

防風

當歸

地黃

川芎

各兩

一分

右分

作四服每服水二鍾煎至一鍾服

大承氣湯

見脾胃門

痿門

有七名

濕熱傷筋筋不能束骨謂之痿若喜怒勞役寒濕之氣致內精血虛耗榮衛失調發為寒熱使皮肉筋骨痿弱無力以運動而成痿狀似柔風脚氣相類以脉症并所因別之柔風脚氣乃外因也凡痿躄內臟不足之氣所為大抵痿弱之由多因肺熱脾虛肺經不虛何熱之有脾氣不虛則宗筋潤而能束骨何痿之有哉

○絕脉

鍼病捷法卷七 痿明

中四

脉大為熱

脉澀為濕

脉滑為痰

脉緩為虛

○治法

濕熱成痿

腰以下軟弱癱瘓不能動履○服清燥湯

脾胃虛成痿

四肢軟弱不能行履○服藿香養胃湯

皮痿

肺熱其症色白毛髮落○服鹿角丸

脉痿

心熱其症膝樞紐如折不相提挈脛筋緩緩不能任地色赤或悲哀陽氣內傷尿血大筋空虛發為肌痺傳為脉痿○服鹿角丸

筋痿

肝熱其症口苦筋膜乾筋急攣兩手無力色蒼爪枯或思慮無窮所願不得房勞太甚宗筋弛緩為白濁傳為筋痿○服鹿角丸

肉痿

脾熱其症口渴肌肉不仁色黃肉蠕動○服鹿角丸

骨痿

腎熱其症腰脊不能舉骨枯髓減色黑齒稿○服鹿角丸

鹿角丸

熟地黄

兩四麋角

酒鎔

一片

重

用

大附子

生

去

皮

右用大麥米二升以一半籍底以一半蓋上以

三布巾隔覆炊一日取出藥與麥別焙乾為末

浸藥酒添清酒煮麥粉為糊搜和杵三千下丸

如桐子大每服五十丸食前温酒或米湯送下
健步丸

漢防已西一川烏炮去苦參酒洗瓜蒌根酒洗羌活

滑石炒柴胡甘草炙肉桂名五防風

澤瀉錢三右為末酒糊和丸如桐子大每服七

十丸空心食前酒送下

藿香養胃湯

藿香白朮白茯苓神麴炒烏藥

縮砂半夏麴薏苡仁人參各錢甘草

華澄茄錢各一右水二鍾姜五片棗一枚煎一鍾

補肝湯

黃芪

錢半 芦

白茯苓

大人 參

乾葛

楮苓

升麻

錢各一

茈胡

苗 當歸身

羌活

連翹

黃蘗

炒

澤瀉

蒼朮

神麴

知母

防風

甘草

炙

陳皮

各五

右作一服水二

鍾煎至一鍾空心熱服忌酒濕麪

五痺門

有三十名

風寒濕三氣合而為之痺風勝為行痺又名風痺
寒勝為痛痺又名寒痺濕勝為著痺又名濕痺其
名有五由三氣客於五臟而成痺也痺之為病或
痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕凡痛者寒
多也不痛不仁病久邪深榮衛凝塞經絡不通皮
膚不營因而不痛不仁也治法當明其三氣入於
何經或表裏虛實偏勝推其因詳其症果因三氣
為病隨經而治不因三氣為痺而為他病當從他

病而治功不可一槩施之

○總脉

右寸沉遲瀦為氣痺

浮為風痺

左寸脉來結為血痺

濡為濕痺

右關脉瀦舉按無力為肉痺

遲為寒痺

左關絃緊數浮沉有力筋痺

數為熱痺

右關脉來滑為痰痺為虛痺

○辯分痺症法

麻木 麻是氣虛木是濕痰死血

痒 痒是血不能營於肌腠也

痛

痛是四肢走痛風熱血虛

節痛

肢節腫痛是火濕兼風寒

臂痛

肩臂冷痛上焦濕熱橫行

攣急

因感濕氣右手疼痛攣拳

項強

脛項強直微痛是痰熱也

痰熱入於脛腕

轉筋

筋轉微痛是熱氣燄於筋

○治法

凡痺症發陰兩三月麻木或不仁或痛或不痛或筋縮或不縮寒即虫行熱則縱緩皮痺不已成肉痺肉痺不已成脉痺脉痺不已成

筋痺筋痺不已成骨痺人而不已則難治

凡痺切不可用過山龍劫藥如用反虛病深

凡治痺蒼朮南星川芎當歸酒炒為主藥在上

加羌活桂枝桔梗歲靈仙在下加牛膝防已

木通黃栢

凡痺痛有常處赤腫灼熱或壯熱此欲成風毒

宜用敗毒散

凡痺痰帶濕熱者先用舟車丸下後以二陳湯

五苓散加黃芩

凡痺氣血兩虛有痰渴陰火痛風用人參山藥

海石南星各一两白朮熟地黃栢龜板酒炙
各二兩乾姜炒黑瑣陽各三錢右為末酒糊
丸服

凡痰痺用二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮亦治
凡濕痺用蒼朮白朮薏苡仁佐以竹瀝及降氣
之藥

凡風痺用小續命湯極驗

凡寒痺用附子炒乾姜之類

凡血虛痺用川芎當歸佐以桃仁紅花

凡氣虛痺用人參白朮之類

凡瘦人痺是血虛與熱脉必澁宜用當歸紅花

桃仁牛膝槐柳

凡肥人痺是濕痰流注經絡脉必滑

凡痺症須分腫與不腫

凡痺症不可食肉厚味不遵守藥規變小便不

通痞悶之症雖魚腥麩麵酒醋皆可斷之

凡十指麻木胃中有痰如濕熱下陷血分自閉

渾身麻木痰在血分亦如是

麻痺

皮膚麻木用四君子湯隨症加減

閉目麻木四肢無力痿弱醋心目昏頭眩○用
衝和補氣湯

痒痺

四肢或體膚痒○用四物湯加黃芩煎調浮萍
未送下或用防風通聖散

痛痺

四肢走痛關節浮腫○服茯苓川芎湯

下部有濕腫痛

用防已龍胆草酒炒黃柏知母水煎空心服如
肥人加蒼朮白朮南星滑石茯苓之類

上中下部

用黃栢炒蒼朮米泔炒南星神麴炒川芎防已
白芷桃仁葳靈仙酒洗桂枝手攢行羌活龍胆草
紅花各等分為末糊丸食前下一百丸

一身兩脇盡痛

服控涎丹

氣血兩虛痛

有濕痰陰火乘氣血虛作痛○用人參山藥海
石南星各一两白朮炒熟地黃栢炒黑龜板酒
炙各二两乾姜燒灰瑣陽各五錢為末酒送下

筋骨痛

用黃柏炒蒼朮炒表實加酒少許肥白人加白
木血虛加當歸痛甚加姜汁煎服

肢節痛

用麻黃去節芍藥各一錢防風荆芥羌活獨活
黃芩枳實川芎煎服

脚跟痛

用四物湯加知母黃柏炒牛膝肉煎服

肩臂痛

用薄桂少許半夏白朮南星香附甘草羌活各

一錢陳皮茯苓威靈仙蒼朮各五分姜三片水煎食後服

傷筋痛

因人提挈傷筋作痛。用人參黃芪甘草川芎芍藥熟地黃阿膠各等分白姜黃此少為引用烏藥姜朮煎服

轉筋

用四物湯加酒炒黃芩紅花

攣急

用二陳湯加金毛狗脊杜仲羌活獨活川芎升麻如脚攣

拳用當歸拈痛湯加杜仲黃栢川芎白朮枳殼
項強

用二陳湯加黃芩羌活紅花煎服

風痺

又名行痺
風勝故也

游走上下無所留止弛縱筋脉不收。服循絡
丸

寒痺

又名痛痺
寒勝故也

汗多四肢緩弱皮膚不仁神昏。服觸痺湯

濕痺

又名著痺
濕勝故也

用蒼朮白朮澤瀉羌活枳實甘草

熱痺

又名痺

其症燭然而悶肌肉熱極體上如鼠走之狀唇口反壞皮膚色變○服升麻湯

氣痺

因憂愁喜怒過則傷氣結成胸腹痺不能注下腰腳重不能行或不言或溺塞則痛流則麻右寸脉沉遲澁

血痺

遇夏得其症煩心心下鼓氣暴氣上逆喘噎乾喜噫厥脹○服枳實散

皮痺

遇秋得其症皮無所知煩滿時嘔氣奔痛。服當歸湯

肌痺

仲夏得其症四肢怠惰發咳嘔汁。服黃芪丸

筋痺

遇春得其症筋攣夜卧驚恐飲多小便數小腹
痛如懷胎。服人參散

骨痺

遇冬得其症骨重不可舉善脹尻以代踵脊以

代頭○服白附子丸

胞痺

其症小腹膀胱按之內痛而滿水道不化上為清涕○服腎瀝湯

腸痺

其症數飲中氣喘息時作飧瀉小便不通○服吳茱萸散

胸痺

喘息不通心下堅痞急痛徹背短氣煩滿自汗○服利膈散

支飲亦能令人痺

其症手足麻多睡眩胃○服茯苓湯

三氣合病

其症皮膚頑厚肌肉酸疼積年不已成癰疹或瘡搔之不痛頭髮脫落○服黃芪酒

枳實散

枳實炒

肉桂

細辛

桔梗

各三

青皮

炒一兩右作三服每服水二鍾姜一片煎八分服

黃芪丸

石鐘乳

附子

炮去

肉苁蓉

酒洗

益智

去

黃芪

白朮

炒

人參

厚朴

煨

當歸

白豆蔻

枳實

良姜

沉香

丁香

吳茱萸

湯洗

訶梨勒

右為末

煨

東阿搗丸梧桐子大每服二十九食前酒送下

黃芪酒

黃芪

附子

炮去

獨活

防風

細辛

牛膝

川芎

甘草

各二兩

川椒

去目開口

秦艽

川烏

炮去

山茱萸

核去

葛根

各二兩

肉桂

大黃

各一兩

當歸

半兩

白朮

炒

乾姜

各一兩

石劉

片以緝袋盛貯以酒二斗浸之春夏浸十日秋

冬浸十四日初服一合日服二次夜進一次虛弱者加肉蓯蓉二兩下利者加女萎蕤三兩

白附子丸

白附子

煨

乾蝎

肉蓯蓉

酒

海銅皮

防風

歲靈仙

獨活

補骨脂

華薜

酥

天麻

天雄

炮去

當歸

丹參

黃芪

各三

兩

肉桂

錢二

雄黃

錢五

安息香

白花蛇

酒洗去

牛膝

各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每

服三十丸白滾湯送下

當歸湯

當歸

防風

黃芪

黃芩

細辛

人參

麻黃

沸去根節

杏仁

去皮

肉桂

柴胡

半夏

右作二服

每服水

二鍾姜三片煎至七分不拘時日服三次

草薺丸

草薺

牛膝

熟地黃

山茱萸

山茱

澤瀉

狗脊

地膚子

白朮

蟬蛻

乾漆

天雄

車前子

茵芋

右

除蟻螬生研外搗為末煉蜜丸如梧桐子大每

服十丸至十五丸空心酒送下一日服三次

循絡丸

五靈脂

敗龜板

酥炙

沒藥

研另

乳香

研另

虎骨

當歸

各二兩

白附子

炮

天麻

焙酒浸

全蝎

去毒

南星

附子

炮去

川烏

炮去

杜仲

去粗皮炒

地龍

去土

續斷

牛膝

酒浸

威靈仙

去苗

烏蛇

酒浸

肉蓯蓉

酒炙

硃砂

另研各

右為末

酒煮糊和丸

如梧桐子大

每服

三十丸

食前酒送下

吳茱萸散

肉豆蔻

乾姜

炮

甘草

炙

吳茱萸

湯泡

錢焙

宿砂仁

陳麴

炒

白朮

各一兩

陳皮

去

白良姜

厚朴去皮姜汁炙各二兩右為末每服一錢食前用米湯

調服

腎瀝湯

交門冬心去五加皮 犀角兩錢各桑螵蛸十枚切炙右

每服五錢水盞半入羊腎一箇去脂膜切細竹

歷少許同煎至一盞去滓空心頓服日再服之

一方用桑白皮無桑螵蛸

利膈散

人參去赤茯苓 前胡各一兩乾姜炮 桂心

甘草炙各五錢陳皮焙去白訶梨勒核去白朮各三分右

末每服五錢水一大盞姜三片煎至三分去滓
不拘時頻頻溫服

人參散

人參二兩 杜仲去粗皮炒 酸枣仁微炒 黃芪各二兩 五味

細辛去苗 熟地黄 秦艽去苗 龜活去苗 丹砂

芍藥各五錢 茯苓去木 右除丹砂另研細末入前

藥末再研令勻每服一錢不拘時用溫酒調服

舟車丸

大黃二兩 甘遂 大戟 芫花 青皮

陳皮各兩 牽牛 木香各半兩 右為末水和丸

如桐子大每服七十九空心白滾湯送下隨症

加減服

經方

常歸酒洗赤芍藥 黃芪去 片姜黃 羌活

甘草炙各二錢右作一服用水二鍾生薑五片紅棗

一枚煎至一鍾去滓不拘時服一方加防風二

錢

茯苓川芎湯

赤茯苓 川芎 桑白皮 防風 官桂

麻黃 芍藥 當歸 甘草炙各五分右用

水二鍾紅棗二枚煎至一鍾空心熱服欲汗以
姜粥投之汗出為度

升麻湯

升麻錢二

茯苓去皮

羚羊角

犀角鎊

防風

人參

羌活各錢半

官桂

錢一

右作一服水二鍾

生姜三片煎至一鍾去滓入竹瀝少許不拘時

二陳湯

見痰飲門

衝和補氣湯

開末卷

四物湯

見諸血門

防風通聖散

開末卷

五苓散

見泄瀉門

小續命湯

見中風門

控涎丹

見中風門

敗毒散

開末卷

茯苓散

開末

脚氣門

有十三名

此門與濕門互相查考治病

脚氣者即是脚腫有南北之分四時之中或久坐
久立濕地或因酒醉汗出脫衣洗足當風取涼皆
可以成脚氣南方地土卑濕霧露所聚由血氣衰
弱則腠理疎清濕襲虛病起於下自外而入也江
東嶺南大率如此北方地高居大寒風處俗飲潼
酪肉食凡飲者以飲多飲速為勝乳酪醇酒濕熱
之物其濕之性潤下氣不能煦故下注於足積久

而成腫滿疼痛軟弱自內而出也脚氣不專於一
氣或兼表虛而得或兼氣血虛而得或兼風寒暑
濕而得或因七情之氣鬱積而得醫者診視果決
而治之

○總脉

浮緊為風

遲滿為寒

濡細為濕

洪數為熱

微滑為虛

牢堅為實

○不治脉

左寸乍大乍小乍無

左尺脉絕

○不治症

脚氣攻心則恍惚謬忘嘔吐食不下眠不安
左寸脉乍大乍小死
脚氣入腎則腰脚軟小便不通呻吟喘目額
黑胸煩左尺脉絕死

○辯驗脚氣法

初得脚氣不覺因他病始發發時一身盡痛
或肢節腫痛便溺阻隔或奄奄然大悶經兩
三日方覺之先後脚起或緩弱或痺或行起
忽倒或兩脛腫滿或足膝枯細或心中驚悸
或小腹不仁或舉體轉筋或見食吐逆惡聞

食氣或胸膈氣急或遍體痠疼是其候也諸
脚氣令人脚脛大脚趺踵重悶甚則上衝心
腹滿悶短氣

○禁戒

嗔怒 猪肉 生菜 桃子 戒色慾

多語 雀肉 生葱 李子 遠濕地

露足當風 夏月閉護 酒醕少飲

冷水洗足 遠濕衣被 用藥淋洗

○脚氣止痛法

用草麻手老粒去殼研如泥同蘇合香丸和

勻成膏敷貼足心其痛立止

○治法

凡脚氣量人盛衰少加滋補藥不然氣血日衰
必使年年遇蒸熱之氣復發不論南北男婦
先服鷄鳴酒不愈隔半月再服神授方

凡脚氣濕從下須提起其濕在下之藥隨氣血
用

凡脚氣東南二方之人自外而起

凡脚氣西北二方之人自內而起

凡脚氣壯人用涼膈散老人用八味丸虛人用

枳實羌活當歸

凡脚氣煎洗用葳靈仙防風荊芥地骨皮川芎
升麻等分煎湯浸洗

凡脚氣用藥末襯鞋底內用防風細辛草烏等
分為末

乾脚氣

脚不腫漸覺枯燥皮膚甲錯○服神烏丸

濕脚氣

脚腫○服神烏丸

脚氣攻心

是血虛而受濕。○用四物湯加黃栢又方以附子為末自己津調貼足心湧泉穴

脚氣轉筋而痛

是血受濕熱。○用四物湯加枳仁黃芩黃連
脚氣有因痰積流注

用姜汁竹瀝南星蒼朮防已黃栢川芎白芷犀角煑柳牛膝

脚氣筋動於足大指上至大腿近腰結縮

是奉養太厚因風寒而作。○用蒼朮南星如常腫者專主乎濕

太陽膀胱經脚氣

頭項腰脊皆痛。用麻黃湯

陽明胃經脚氣

寒熱伸欠鼻乾腹脹膝中循外皆痛。用大黃湯

少陽膽經脚氣

口苦脇痛面垢體無膏澤頭項痛。用半夏湯

已上膀胱胃胆三腑齊病。明曰三陽合病寒

熱關節重痛手足拘攣冷痺緩縱氣上嘔吐

脉必浮緊絃數合前三方治之。如二陽合病

合前二方治之

太陰脾經脚氣

腹滿咽連舌急胸膈滿骨節煩疼四肢拘急浮腫○用六物附子湯

少陰腎經脚氣

上氣喘急小腹不仁腹脊足骨皆痛○服八味丸三十五粒

厥陰肝經脚氣

脇腰偏疼陰囊小腹夾臍各處脹痛○服神應養真丹

已上三陰經不合病臟腑不同故也

脚氣煩疼背沉重胸膈不利及偏疼下注於足脛
腫痛○服當歸拈痛湯

神驗方

木鱉子每箇作兩瓣麩炒切碎再炒用皮昏去
盡油為度厚桂各等分同為末用熱酒調服以
醉為度蓋覆得汗即愈一方名夢中神授方

木瓜丹

右用宣木瓜一箇柱大者亦可用去穰隔切去
蓋用好艾填在木瓜內須滿實却用蓋覆竹簽

定飯甑蒸爛次下入羌活一两獨活二两附子
炮半两同為末先搗木灰令爛次下藥末搗為
丸如梧桐子大每服三五十丸食前用溫酒或
鹽湯送下

烏藥丸

草烏

不去皮

白芍藥

威靈仙

北細辛

沒藥

木鱉子

去殼紙

追去

右為末薄糊丸如梧桐子

大每服七丸至十丸食後臨卧木灰湯下酒下

亦可以身上覺麻痺即是効或未効加至十五

丸量虛實不可妄增丸數亦不可於食前服之

有草烏在內最忌服藥後食熱物衝動烏頭之
毒則昏不知人矣

鷄鳴散

換柳

七枚

陳皮

一兩

木瓜

一兩

吳茱萸

二錢

生姜

桔梗

各半兩

紫蘇莖葉

三錢

右為末分作八服隔宿

用水三大椀慢火煎至椀半去滓再用水二椀
煎取一小椀兩次以煎汁相和安頓床頭次日
五更分二三服只是冷服冬月略溫亦得服了
用餅餌壓下如服不盡留次日漸々喫亦冷服
藥天明大便當下一椀許黑糞水即是

神鳥丸

金毛狗脊

煆去毛五錢

牛膝肉

浸酒

肉蓯蓉

酒浸各一兩半

虎脰骨

炙酥

海桐皮

川萆薢

川烏

炮去皮切片炒令

色變各一兩

右為末用木瓜膏子和丸如梧桐子大

每服七十丸空心用溫酒送下

神應養真丹

當歸

酒浸

白芍藥

熟地黄

天麻

川芎

羌活

各等分

右為末煉蜜丸如鷄子黃大每服一

丸木瓜兔絲子浸酒下脚痺薏苡仁浸酒下中

風溫酒米湯下一方無羌活有木瓜炒阿膠

八味丸

門見牙

六物附子湯

卷開末

涼膈散

熱門火

當歸拈痛湯

見中

麻黃湯

寒門傷

蘇合香丸

卷開末

四物湯

門見血

神授方

驗即神方

半夏湯

卷開末